Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. 500 mg compresse

Acido acetilsalicilico

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3-5 giorni.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos'è ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.
3. Come deve prendere ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. e a cosa serve
ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. il principio attivo acido acetilsalicilico, che appartiene al gruppo dei medicinali chiamati antinfiammatori non steroidei (FANS), usati per ridurre l'infiammazione (antinfiammatori), il dolore (analgesici) e la febbre (antipiretici).
ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. si usa nel trattamento dei sintomi della febbre, dell'influenza, del raffreddamento, del mal di testa, del mal di denti, del dolore ai nervi (nevralgie), dei dolori mestruali, dei dolori reumatici e muscolari.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3-5 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.

Non prenda ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.
- se è allergico all'acido acetilsalicilico, ad altri medicinali usati per diminuire il dolore, la febbre e l'infiammazione (FANS e altri antinfiammatori) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di lesioni alla mucosa dello stomaco o del primo tratto dell'intestino (ulcera gastroduodenale);
- se ha una predisposizione alle perdite di sangue (diatesi emorragica);
- se soffre di grave insufficienza della funzione dei reni, del cuore e del fegato (grave insufficienza renale, cardiaca e epatica);
- se soffre di una malattia causata dalla mancanza dell'enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi (favismo);
- se sta prendendo metotrexato (a dosi di 15 mg alla settimana o più) o warfarin (Vedere il paragrafo "Altri medicinali e ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.");
- se in passato ha sofferto di difficoltà respiratoria (asma) causata dall'assunzione di sostanze simili all'acido acetilsalicilico (salicilati) o di altri FANS;
- se è nell'ultimo trimestre di gravidanza o se sta allattando al seno;
- se la persona che deve prendere il medicinale è un bambino o un adolescente, specialmente se presenta sintomi di influenza o varicella (Vedere il paragrafo "Avvertenze e precauzioni");

- se la persona che deve prendere il medicinale è un bambino o un adolescente di età inferiore a 16 anni.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.

L'acido acetilsalicilico e gli altri FANS possono causare reazioni allergiche come attacchi d'asma, raffreddore, eruzioni sulla pelle (orticaria), specialmente se in passato ha manifestato allergia dopo l'uso di questo tipo di medicinali o di altre sostanze (es. reazioni cutanee, prurito, orticaria) (Vedere il paragrafo "Possibili effetti indesiderati"). Se ha sofferto di asma e/o raffreddore allergico (con o senza poliposi nasale) e/o orticaria, queste reazioni possono essere più frequenti e anche gravi. In rari casi queste reazioni possono causare la morte.

Usi questo medicinale con cautela e dietro controllo del medico se una delle seguenti situazioni la riguardano:
- se è a rischio di allergia;
- se ha una predisposizione alle lesioni allo stomaco, se soffre di ulcera o se ne ha sofferto in passato perché questo medicinale, come altri FANS, può causare gravi danni allo stomaco (sanguinamento, ulcera, perforazione). Questo può accadere soprattutto se usa dosi elevate del medicinale e si deve tener presente se deve sottoporsi ad esami delle feci;
- se assume abitualmente alcool;
- se ha problemi di coagulazione del sangue o se è in cura con medicinali anticoagulanti, perché questo medicinale aumenta il rischio di emorragie;
- se ha problemi ai reni, al fegato o al cuore. Soprattutto se è in cura con diuretici e se è anziano (ha più di 70 anni);
- se soffre di asma;
- se presenta elevati livelli di acido urico nel sangue (iperuricemia), se soffre di una infiammazione alle articolazioni chiamata gotta o se è in trattamento con medicinali per la gotta (uricosurici);
- se è in trattamento con altri medicinali elencati nel paragrafo "Altri medicinali e ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.";
- se deve sottoporsi ad un intervento chirurgico (anche di piccola entità, ad esempio l'estrazione di un dente), perché potrebbero verificarsi problemi di coagulazione del sangue.

Bambini e adolescenti
Non è raccomandato l'uso di questo medicinale nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 16 anni di età. Specialmente se soffrono di infezioni causate da virus come influenza A, influenza B e varicella questo medicinale non deve essere preso perché c'è il rischio che si manifesti una malattia molto rara, ma pericolosa per la vita, caratterizzata da vomito, diarrea e problemi al sistema nervoso centrale (Sindrome di Reye), che richiede un immediato intervento medico.

Anziani
I soggetti di età superiore ai 70 anni, soprattutto se assumono altri medicinali devono consultare il medico prima di prendere ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M., perché hanno maggiori probabilità di manifestare effetti indesiderati gravi.

Altri medicinali e ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non prenda ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. insieme ai seguenti medicinali:
- metotrexato, un medicinale utilizzato per trattare alcuni tipi di tumore (dosi maggiori o uguali a 15 mg alla settimana);
- warfarin, un medicinale utilizzato per migliorare la circolazione del sangue.

ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. può essere preso insieme ai seguenti medicinali solo dopo prescrizione del medico:

- medicinali usati per migliorare la circolazione del sangue come antiaggreganti piastrinici, trombolitici, anticoagulanti orali o parenterali;
- medicinali antinfiammatori del gruppo FANS, tranne quelli utilizzati per uso locale (via topica);
- metotrexato (a dosi inferiori a 15 mg alla settimana);
- medicinali antidepressivi appartenenti al gruppo degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.

Informi il medico se sta utilizzando i seguenti medicinali, perché potrebbe essere necessario aggiustare la dose di ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.:
- medicinali usati per abbassare l'alta pressione (ACE-inibitori);
- acido valproico, un medicinale usato per l'epilessia;
- medicinali usati per ridurre l'acidità (antiacidi);
- medicinali usati per il diabete, come insulina e medicinali assunti per bocca per ridurre il livello di zuccheri nel sangue (ipoglicemizzanti orali);
- digossina, un medicinale usato per problemi al cuore;
- medicinali usati per abbassare la pressione del sangue (diuretici);
- acetazolamide, un medicinale usato per il glaucoma;
- medicinali appartenenti al gruppo dei corticosteroidi (esclusi quelli assunti per via esterna e per la terapia sostitutiva nell'insufficienza corticosurrenale);
- fenitoina, un medicinale usato per l'epilessia;
- metoclopramide, un medicinale usato contro il vomito;
- medicinali usati contro l'accumulo di acido urico (uricosurici), come il probenecid;
- zafirlukast, un medicinale usato per il trattamento dell'asma.

Se deve prendere altri medicinali per via orale lo faccia dopo 1 o 2 ore dall'assunzione di ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.

ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. con alcool
Eviti di assumere alcool insieme a questo medicinale perché può aumentare il rischio di sanguinamento dello stomaco e dell'intestino.

Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda questo medicinale nell'ultimo trimestre di gravidanza.
Nel primo e secondo trimestre di gravidanza ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. deve essere preso solo dopo aver consultato il medico e aver valutato il rapporto beneficio/rischio.
Non prenda questo medicinale se sta allattando al seno.
Se ha problemi di fertilità o se deve sottoporsi ad un esame per la fertilità tenga presente che ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. potrebbe interferire con la fertilità.

Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari
ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M., particolarmente se preso ad alte dosi, può provocare mal di testa (cefalea) o vertigini. Se questo capita eviti di guidare veicoli o utilizzare macchinari.

3. Come prendere ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 compresse, 2- 3 volte al giorno.
Prenda le compresse preferibilmente dopo i pasti principali o, comunque, a stomaco pieno, sempre con acqua, tè, limonata, ecc.
Prenda sempre il dosaggio minimo efficace e lo aumenti solo se non è sufficiente a diminuire i sintomi (dolore e febbre).

Non superi le dosi consigliate.
Prenda questo medicinale per il periodo più breve possibile e comunque per non più di 3-5 giorni senza il parere del medico.

Uso negli anziani
Se è anziano deve utilizzare le dosi minime sopraindicate.

Se prende più ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. di quanto deve
Se si supera la dose di 100 mg per kg di peso corporeo al giorno, per 2 giorni consecutivi o per periodi più lunghi (uso cronico) si possono verificare effetti tossici che possono essere pericolosi per la vita.
L'avvelenamento prolungato nel tempo non causa sintomi particolari e perciò può essere pericoloso.

A seguito di una intossicazione da lieve a moderata potrebbero verificarsi problemi respiratori, sudorazione, nausea, vomito, mal di testa (cefalea) e vertigini.

A seguito di una intossicazione da moderata a grave possono verificarsi anche problemi al cuore, febbre molto alta, problemi ai reni, alterazioni dei livelli di zucchero nel sangue, problemi all'orecchio, problemi allo stomaco, alterazione dei parametri del sangue, problemi al cervello, sonnolenza, confusione mentale, coma, convulsioni e danni al fegato.

A dosi elevate possono manifestarsi anche alterazioni della percezione del gusto, eruzioni cutanee, prurito, infiammazione della mucosa dell'occhio (congiuntivite), perdita eccessiva di peso (anoressia), riduzione della vista, gravi problemi a livello del sangue e dei reni.
Se si verifica una intossicazione da acido acetilsalicilico il medico deve somministrare carbone attivo, eseguire una lavanda gastrica o aumentare forzatamente la diuresi e somministrare soluzioni di sali per ristabilire il normale equilibrio salino (elettrolitico) e acido-base. L'acido acetilsalicilico è eliminabile anche attraverso la filtrazione del sangue (dialisi).
Se a seguito di sovradosaggio si manifesta una reazione allergica, il medico può somministrare adrenalina, corticosteroidi e antistaminici.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M., avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se si dimentica di prendere ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose, ma continui a seguire la terapia secondo le dosi ed i tempi riportati in questo foglio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Durante il trattamento con acido acetilsalicilico sono stati osservati e riportati i seguenti effetti indesiderati:

- accumulo patologico di sangue nel cervello (emorragia cerebrale) potenzialmente mortale, specialmente in pazienti con pressione sanguigna alta non controllata (ipertensione) e/o che stanno assumendo medicinali usati per diminuire la coagulazione del sangue (anticoagulanti);
- diminuzione del numero di piastrine (piastrinopenia);
- sanguinamenti allo stomaco e all'intestino (gastrointestinali). Questi disturbi si verificano soprattutto in persone più sensibili e si possono ridurre prendendo il medicinale a stomaco pieno;
- disturbi allo stomaco come bruciore (pirosi), dolore epigastrico, dolore addominale, vomito, diarrea, nausea;
- perdita di sangue dalle gengive (gengivorragia);

- prolungamento del tempo di sanguinamento, diminuzione dell'emoglobina e del ferro nel sangue (anemia e sideropenia) a seguito di sanguinamenti dello stomaco e dell'intestino, debolezza (astenia), pallore e diminuzione del flusso sanguigno (ipoperfusione);
- mal di testa (cefalea), vertigini;
- percezione di fischi, ronzii ed altri rumori nell'orecchio (tinnito);
- difficoltà a respirare (asma), infiammazione della mucosa nasale (rinite), perdita di sangue dal naso (epistassi);
- gonfiore di viso, labbra, bocca, lingua o gola che può causare difficoltà di deglutizione o di respirazione (angioedema) e/o orticaria e/o eritema associati a reazioni allergiche;
- alterazione della funzione renale (in presenza di condizioni di alterazione del flusso sanguigno renale), perdita di sangue nelle vie urinarie e riproduttive (sanguinamento urogenitale);
- perdita di sangue prima o dopo operazioni chirurgiche (emorragie peri-operatorie), accumulo e ristagno di sangue (ematoma);
- ritardo del parto.

Altri effetti indesiderati che si possono manifestare, classificati per frequenza sono:
Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1.000)
- una malattia caratterizzata da vomito, diarrea e problemi al sistema nervoso centrale (sindrome di Reye);
- perdita di sangue a livello dello stomaco e dell'intestino, vomito con presenza di sangue (ematemesi), emissione di feci nere (melena), infiammazione dell'esofago (esofagite);
- tossicità a livello del fegato, che si manifesta con aumento dei livelli di alcuni enzimi (transaminasi);
- reazione allergica incontrollata e grave (shock anafilattico).

La maggior parte degli effetti indesiderati sono dipendenti sia dalla dose che dalla durata del trattamento.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C
Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad".
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.
- Il principio attivo è acido acetilsalicilico. Ogni compressa contiene 500 mg di acido acetilsalicilico.
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, amido di mais, talco.

Descrizione dell'aspetto di ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M. e contenuto della confezione
Confezione da 20 compresse da 500 mg.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.
Via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

Italia

Produttore
Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.
Via Monterosso, 273 - 21042, Caronno Pertusella (VA)
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 22 Novembre 2016